

# Tabla de dosificación del paracetamol en niños

## Acetaminophen Dosage Chart, Pediatric

El paracetamol, también llamado Tylenol®, es un medicamento que se utiliza para aliviar el dolor y la fiebre en los niños.

### Antes de administrar el medicamento

**Verifique en la etiqueta** del envase la cantidad y la potencia (*concentración*) de paracetamol. Las gotas concentradas de paracetamol pediátrico (80 mg por 1 ml) ya no se fabrican ni se venden en Estados Unidos, aunque están disponibles en otros países, incluido Canadá.

**Determine la dosis** de acuerdo al peso del niño. El medicamento puede administrarse en forma de líquido, comprimidos masticables o polvo para disolver. Cada tipo puede tener una concentración diferente del medicamento.

**Medida de la dosis.** Para medir el líquido, use una jeringa oral o el vaso para el medicamento que viene con el frasco. **No** use cucharas domésticas ni cucharitas de té.

**No** le administre paracetamol al niño si tiene 12 semanas de edad o menos, salvo que se lo haya indicado el pediatra.

### Dosis por peso

**Peso: 6 a 11 libras (2.7 a 5 kg)**

- **Jarabe (160 mg cada 5 ml):** 1.25 ml.
- **Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg):** No se recomiendan.
- **Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete):** No se recomiendan.

**Peso: 12 a 17 libras (5.4 a 7.7 kg)**

- **Jarabe (160 mg cada 5 ml):** 2.5 ml.
- **Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg):** No se recomiendan.
- **Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete):** No se recomienda.

**Peso: 18 a 23 libras (8.2 a 10.4 kg)**

- **Jarabe (160 mg cada 5 ml):** 3.75 ml.
- **Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg):** No se recomiendan.
- **Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete):** No se recomienda.

**Peso: 24 a 35 libras (10.9 a 15.9 kg)**



- **Jarabe (160 mg cada 5 ml):** 5 ml.
- **Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg):** 1 comprimido.
- **Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete):** No se recomienda.

**Peso: 36 a 47 libras (16.3 a 21.3 kg)**



- **Jarabe (160 mg cada 5 ml):** 7.5 ml.
- **Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg):** 1½ comprimidos.
- **Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete):** No se recomienda.

**Peso: 48 a 59 libras (21.8 a 26.8 kg)**



- **Jarabe (160 mg cada 5 ml):** 10 ml.
- **Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg):** 2 comprimidos.
- **Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete):** 2 paquetes.

**Peso: 60 a 71 libras (27.2 a 32.2 kg)**



- **Jarabe (160 mg cada 5 ml):** 12.5 ml.
- **Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg):** 2½ comprimidos.
- **Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete):** 2 paquetes.

**Peso:** 72 a 95 libras (32.7 a 43.1 kg)



- **Jarabe (160 mg cada 5 ml):** 15 ml.
- **Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg):** 3 comprimidos.
- **Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete):** 3 paquetes.

**Peso:** 96 libras y más (43.6 kg y más)

- **Jarabe (160 mg cada 5 ml):** 20 ml.
- **Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg):** 4 comprimidos.
- **Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete):** No se recomiendan.

## Siga estas instrucciones en su casa:

- Repita la dosis cada 4 a 6 horas según sea necesario o como se lo haya recomendado el pediatra. **No** le administre más de 5 dosis en 24 horas.
- **No** le administre más de un medicamento que contenga paracetamol al mismo tiempo. Tomar demasiado paracetamol puede causar problemas importantes como daño hepático.
- **No** le administre aspirina, a menos que se lo indiquen el pediatra o el cardiólogo. La aspirina se ha asociado a reacciones médicas graves como el síndrome de Reye.

## Resumen

- El paracetamol se usa frecuentemente para aliviar el dolor y la fiebre en los niños.

- Determine la dosis correcta para el niño sobre la base de su peso.
- **No** le administre más de un medicamento que contenga paracetamol al mismo tiempo.
- Repita la dosis cada 4 a 6 horas según sea necesario o como se lo haya recomendado el pediatra.  
**No** le administre más de 5 dosis en 24 horas.

Esta información no tiene como fin reemplazar el consejo del médico. Asegúrese de hacerle al médico cualquier pregunta que tenga.

Document Released: 12/18/2006 Document Revised: 01/08/2020 Document Reviewed: 01/08/2020  
Elsevier Interactive Patient Education © 2020 Elsevier Inc.