

Tabla de dosificación del ibuprofeno en niños

No se recomienda el uso de ibuprofeno u otros antiinflamatorios ya que puede empeorar los síntomas de COVID-19.

Ibuprofen Dosage Chart, Pediatric

El ibuprofeno, también denominado Motrin® o Advil®, es un medicamento que se utiliza para aliviar el dolor y la fiebre en niños.

Antes de administrar el medicamento

Verifique en la etiqueta del envase la cantidad y la potencia (*concentración*) de ibuprofeno. **Determine la dosis** de acuerdo al peso del niño. El medicamento puede administrarse en forma de líquido, comprimidos masticables o comprimidos estándar. Cada tipo puede tener una concentración diferente del medicamento.

Medida de la dosis. Para medir el líquido, use una jeringa oral o el vaso para el medicamento que viene con el frasco. **No** use cucharas domésticas ni cucharitas de té.

No le administre ibuprofeno al niño si tiene 6 meses o menos, salvo que se lo haya indicado el pediatra del niño.

Dosis por peso

Peso: 12 a 17 libras (5.4 a 7.7 kg)

Gotas concentradas para bebés (50 mg en 1.25 ml): 1.25 ml.

Jarabe para niños (100 mg en 5 ml): 2.5 ml.

Comprimidos o comprimidos masticables para niños o adolescentes (comprimidos de 100 mg): No se recomiendan.

Peso: 18 a 23 libras (8.2 a 10.4 kg)

Gotas concentradas para bebés (50 mg en 1.25 ml): 1.875 ml.

Jarabe para niños (100 mg en 5 ml): 4 ml.

Comprimidos o comprimidos masticables para niños o adolescentes (comprimidos de 100 mg): No se recomiendan.

Peso: 24 a 35 libras (10.9 a 15.9 kg)



Gotas concentradas para bebés (50 mg en 1.25 ml): 2.5 ml.

Jarabe para niños (100 mg en 5 ml): 5 ml.

Comprimidos o comprimidos masticables para niños o adolescentes (comprimidos de 100 mg): No se recomiendan.

Peso: 36 a 47 libras (16.3 a 21.3 kg)



Gotas concentradas para bebés (50 mg en 1.25 ml): 3.75 ml.

Jarabe para niños (100 mg en 5 ml): 7.5 ml.

Comprimidos o comprimidos masticables para niños o adolescentes (comprimidos de 100 mg): No se recomiendan.

Peso: 48 a 59 libras (21.8 a 26.8 kg)



Gotas concentradas para bebés (50 mg en 1.25 ml): 5 ml.

Jarabe para niños (100 mg en 5 ml): 10 ml.

Comprimidos o comprimidos masticables para niños o adolescentes (comprimidos de 100 mg): 2 comprimidos.

Peso: 60 a 71 libras (27.2 a 32.2 kg)



Gotas concentradas para bebés (50 mg en 1.25 ml): No se recomiendan.

Jarabe para niños (100 mg en 5 ml): 12.5 ml.

Comprimidos o comprimidos masticables para niños o adolescentes (comprimidos de 100 mg): 2½ comprimidos.

Peso: 72 a 95 libras (32.7 a 43.1 kg)



Gotas concentradas para bebés (50 mg en 1.25 ml): No se recomiendan.

Jarabe para niños (100 mg en 5 ml): 15 ml.

Comprimidos o comprimidos masticables para niños o adolescentes (comprimidos de 100 mg): 3 comprimidos.

Peso: 96 libras y más (43.5 kg y más)

Gotas concentradas para bebés (50 mg en 1.25 ml): No se recomiendan.

Jarabe para niños (100 mg en 5 ml): 20 ml.

Comprimidos o comprimidos masticables para niños o adolescentes (comprimidos de 100 mg): 4 comprimidos.

Siga estas instrucciones en su casa:

Repita la dosis cada 6 a 8 horas según sea necesario o como se lo haya recomendado el pediatra.

No le administre más de 4 dosis en 24 horas.

No le administre aspirina, a menos que se lo indiquen el pediatra o el cardiólogo. La aspirina se ha asociado a reacciones médicas graves como el síndrome de Reye.

Resumen

El ibuprofeno es un medicamento que se utiliza para aliviar el dolor y la fiebre en niños.
Determine la dosis correcta para el niño sobre la base de su peso.
Repita la dosis cada 6 a 8 horas según sea necesario o como se lo haya recomendado el pediatra.
No le administre más de 4 dosis en 24 horas.

Esta información no tiene como fin reemplazar el consejo del médico. Asegúrese de hacerle al médico cualquier pregunta que tenga.

Document Released: 12/18/2006 Document Revised: 01/08/2020 Document Reviewed:
01/08/2020 Elsevier Interactive Patient Education © 2020 Elsevier Inc.